



MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL EBRO

LAGUNA DE GUALGUERRERO

Red de lagos

PUNTO DE MUESTREO

Código masa: - **Código muestreo:** GUI-1 **Fecha actualización de la ficha:** 26/07/2011

Tipología: Interior cuenca sedimentación, mineralización baja permanente

Red a la que pertenece:

Operativa
Vigilancia

Referencia
Investigación

Parámetros biológicos analizados:

Fitoplancton
Otra flora acuática

Fauna bentónica invertebrada
Peces

LOCALIZACIÓN


Localidad: Cubel
Municipio: Cubel
Provincia: Zaragoza
CCAA: Aragón

Coordenadas: **Huso:** 30T
X(m): 734619 **Y(m):** 4630497
Nº Mapa 1:50.000: 464
Altitud (m): 1.084

Ruta de acceso:


Desde Nuévalos llegar a Cubel por la carretera A-22506. Pasado el pueblo y el desvío a Acered, tomar la primera pista a mano izquierda. La pista pasa al lado de una casa con árboles y llega hasta la laguna (hay una casita abandonada cerca de la laguna).

Croquis: Nuévalos



FOTOGRAFÍAS DEL LAGO





1- Laguna de Gualguerrero



Presiones e impactos

Presiones hidromorfológicas

- Represamientos
- Detracciones de agua
- Deseccación
- Aportaciones de excedentes de riegos
- Ahondamiento de la cubeta
- Transformación de las riberas

Presiones fisicoquímicas

- Eutrofización
- Contaminación por vertidos directos
- Contaminación por aportes difusos

Grado de intervención (CHE, 2005)

- Alto Medio Bajo

Comentario a las presiones e impactos

El lago está situado en una zona de uso agrícola (campos de secano) donde se quema la vegetación de helófitos de la ribera.

Instalaciones existentes y usos

Construcciones, infraestructuras y usos humanos

- Pista no asfaltada
- Calzada asfaltada
- Inmuebles
- Motas o represas
- Telesilla

Usos

Agrícola	68%
Ganadero	7%
Silvícola	%
Urbano	%

FOTOGRAFÍAS DE LAS PRESIONES Y/O LAS INSTALACIONES



Campos de cereales alrededor de la laguna

**Elementos biológicos****Estación analizada****Código masa:** -**Fecha muestreo**

01/08/2007

26/08/2008

16/07/2009

10/08/2010

Parámetros	Métricas	Valores	Valores	Valores	Valores
Fitoplancton	InGA	0,76	0,60	0,90	0,55
	Clo (mg Clo-a/m ³)	14,83	2,02	2,44	14,09
	Biovolumen (mm ³ /L)	4,61	0,58	1,22	4,33
Otra flora acuática	Riqueza específica	6	9	11	11
	Cobertura total de helófitos (%)	20	70	70	70
Fauna bentónica de invertebrados	QAELS	4,30	10,37	9,83	5,90

Comentarios

Se ha observado la presencia de cangrejo americano (*Procambarus clarkii*).

Elementos hidromorfológicos que afectan a los elementos biológicos**Régimen hidrológico**

Mediante la realización de transectos de profundidades se ha calculado un volumen aproximado de la laguna de 0,05 hm³.

En los muestreos realizados en 2008 y 2010 no se apreció variación del nivel de agua del lago respecto al observado en 2007.

En el muestreo realizado en 2009 se apreció una disminución del nivel de agua de aproximadamente 1 m respecto al observado en 2007.

Presenta conexión con aguas subterráneas, en concreto con el sistema Páramos del alto Jalón.

Condiciones morfológicas del lago

Superficie de la laguna es aproximadamente de 5 ha. Su profundidad máxima es de 2,5 m. La cubeta presenta una pendiente dominante inferior al 25% al igual que la zona litoral. La zona litoral del estanque está ocupada por un anillo incompleto de helófitos (*Carex* sp. y *Scirpus* sp.).

Elementos químicos y fisicoquímicos que afectan a los elementos biológicos

Estación analizada

Código masa: -

Parámetros	Métricas	01/08/2007		26/08/2008	
		Valor	Estado según Ind. FQ	Valor	Estado según Ind. FQ
Transparencia	D.S. (m)	1,1	NC	1,0	NC
	Turbidez (clases) ¹	2	NC	2	NC
	Color	Marrón verdoso	NC	Transp. marrón	NC
Condiciones térmicas	Temperatura (°C)	22,9	NC	21,1	NC
Cond. de oxigenación	O₂ dis (mg/L)	10,1	NC	8,4	NC
Salinidad	Conductividad (µS/cm)	252	NA	287	NA
Estado de acidificación	pH (Unid.)	9,1	NA	8,6	NA
	Alcalinidad total (meq/L)	1,69	NA	2,17	NA
Condiciones relativas a los nutrientes	NH₄ (mg/L)	Precip. blanco	NC	0,55	NC
	NO₃ (mg/L)	<0.005	NC	<0.005	NC
	NO₂ (mg/L)	<0.005	NC	0,016	NC
	P-PO₄ (mg/L)	0,012	NC	<0.005	NC
	P.tot (mg/L)	0,052	A	0,018	NA

Parámetros	Métricas	16/07/2009		10/08/2010	
		Valor	Estado según Ind. FQ	Valor	Estado según Ind. FQ
Transparencia	D.S. (m)	1,4	NC	1,2	NC
	Turbidez (clases) ¹	2	NC	4	NC
	Color	Verde botella	NC	Verde oscuro	NC
Condiciones térmicas	Temperatura (°C)	24,7	NC	24,4	NC
Cond. de oxigenación	O₂ dis (mg/L)	6,9	NC	9,0	NC
Salinidad	Conductividad (µS/cm)	352	NA	311	NA
Estado de acidificación	pH (Unid.)	8,2	NA	8,5	NA
	Alcalinidad total (meq/L)	2,37	NA	2,65	NA
Condiciones relativas a los nutrientes	NH₄ (mg/L)	0,55	NC	0,20	NC
	NO₃ (mg/L)	<0.005	NC	0,041	NC
	NO₂ (mg/L)	<0.005	NC	0,011	NC
	P-PO₄ (mg/L)	0,009	NC	0,015	NC
	P.tot (mg/L)	0,023	NA	0,022	NA

(1) **Turbidez** (Clases):
 1= transparentes;
 2= algo turbias;
 3= turbias;
 4= muy turbias

NA: No alterado, A: Alterado, NC: No computa

¿La situación del lago permitía obtener datos significativos?

2007: Si No **Comentarios:**
 Es posible que la laguna haya sufrido estrés hídrico y este afecte las muestras recogidas y por lo tanto al estado ecológico de la laguna

2009: Si No **Comentarios:**

2008: Si No **Comentarios:**

2010: Si No **Comentarios:**

Evaluación del ESTADO ECOLÓGICO DEL LAGO

	Conc. Clorofila (mg Clo-a/m ³)	2007		2008		2009		2010	
		Valor índice	Nivel calidad	Valor índice	Nivel calidad	Valor índice	Nivel calidad	Valor índice	Nivel calidad
Fitoplancton	Conc. Clorofila (mg Clo-a/m ³)	14,83	Mod	2,02	MB	2,44	MB	14,09	Mod
	Biovol. total fitopl. (mm3/L)	(c)	-	(c)	-	(c)	-	(c)	-
	InGa	(c)	-	(c)	-	(c)	-	(c)	-
	Nivel de calidad FITOPLANCTON	Mod		MB		MB		Mod	

Otra Flora Acuática	Riqueza especif. macrofitos	6	MB	9	MB	11	MB	11	MB
	% cinturón helófitos	25%	Def	70%	MB	70%	MB	70%	MB
	Nivel de calidad OTRA FLORA ACUÁTICA	B		MB		MB		MB	

Invertebrados	QAELS _{Ebro}	4,30	Def	10,37	MB	9,83	MB	5,90	Mod
	Nivel de calidad FAUNA BENTÓNICA INV.	Def		MB		MB		Mod	

Estado ecológico según elementos de calidad biológicos	Def	MB	MB	Mod
Cond. físico-químicas del lago	Mod o Inferior	B	B	B
Cond. hidromorfológicas del lago	MB	MB	MB	MB

Def	MB	MB	Mod
-----	----	----	-----

- (a) No muestreado ese año
- (b) Lago seco
- (c) Métrica no considerada

Comentarios



Fitoplancton

Fecha muestreo		01/07/2007	
COMPOSICIÓN	ABUNDANCIA células/mL	BIOVOLUMEN mm ³ /L	CUALITATIVO
CYANOPHYTA			
<i>Aphanocapsa</i> sp.	72000	0,0267	
BACILLARIOPHYCEAE			
Diatomeas no coloniales			
<i>Cymbella</i> sp.	18	0,0158	
<i>Navicula</i> sp.	18	0,0276	
<i>Nitzschia</i> sp.	18	0,0073	
CHRYSOPHYCEAE (sensu lato)			
Crisofíceas no coloniales			
<i>Lagynion ampullaceum</i>	108	0,0031	
<i>Pseudopedinella</i> sp.	18	0,0071	
HAPTOPHYTA			
<i>Chrysochromulina parva</i>	108	0,0033	
EUGLENOPHYTA			
<i>Colacium</i> sp.			1
<i>Euglena variabilis</i>	36	0,1115	1
<i>Trachelomonas hispida</i>			+
<i>Trachelomonas volvocina</i>	36	0,0562	
DINOPHYTA			
<i>Ceratium hirundinella</i>			2
<i>Peridinium cinctum</i>	21	1,0363	5
<i>Peridinium</i> sp. (pequeño)	36	0,0385	
CRYPTOPHYTA			
<i>Cryptomonas erosa</i>	108	0,2485	
<i>Cryptomonas marssonii</i>	18	0,0128	
<i>Cryptomonas phaseolus</i>	90	0,0794	
<i>Cryptomonas reflexa</i>	36	0,1670	
<i>Katablepharis ovalis</i>	18	0,0013	
<i>Plagioselmis nannoplanctica</i>	108	0,0106	
CHLOROPHYTA			
<i>Cosmarium botrytis</i>			1
Clorococcales no coloniales			
<i>Ankyra lanceolata</i>	18	0,0011	
<i>Monoraphidium arcuatum</i>	72	0,0017	
<i>Monoraphidium contortum</i>	18	0,0003	
<i>Monoraphidium komarkovae</i>	18	0,0013	
<i>Tetraedron minimum</i>	342	0,4916	+
Clorococcales coloniales			
<i>Botryococcus braunii</i>			1
<i>Coelastrum astroideum</i>	144	0,0179	
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>			2
<i>Dictyosphaerium tetrachotomum</i>	9936	2,3120	4
<i>Oocystis</i> cf. <i>naegelii</i>	36	0,0806	
<i>Oocystis</i> sp.	18	0,0066	
<i>Pediastrum boryanum</i>			3
<i>Pediastrum tetras</i>	72	0,0117	

<i>Scenedesmus aculeolatus</i>	36	0,0024	
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	72	0,0081	+
Volvocales coloniales			
<i>Eudorina illionensis</i>			+
<i>Pandorina morum</i>			2

TOTAL	83577 células/mL	4,79 mm ³ /L
Porcentaje de cianobacterias	0,58%	
Concentración clorofila (mg Clo-a/m³)	14,83	
InGA	0,76	

Clases de abundancia	% de presencia
+	presencia
1	<1%
2	1-10%
3	11-30%
4	31-60%
5	>60%



Fitoplancton

Fecha muestreo	26/08/2008
----------------	------------

COMPOSICIÓN	ABUNDANCIA células/ml	BIOVOLUMEN mm ³ /L	CUALITATIVO
CYANOPHYTA			
<i>Aphanizomenon</i> sp. (fil/mL)	26	0,0230	
<i>Aphanocapsa</i> sp.	879	0,0003	
<i>Chroococcus</i> cf. <i>minor</i>	2845	0,0233	
<i>Pseudanabaena</i> sp.	760	0,0131	
<i>Snowella</i> sp.	9104	0,0381	
BACILLARIOPHYCEAE			
Diatomeas no coloniales			
<i>Cyclotella</i> sp.	5	0,0053	
CHRYSOPHYCEAE (sensu lato)			
Crisofíceas no coloniales			
<i>Chromulina</i> sp.	5	0,0004	
Crisofíceas indet. 5 µm	41	0,0029	
<i>Pseudokephyrion</i> sp.	26	0,0009	
DINOPHYTA			
<i>Gymnodinium</i> sp.	10	0,0111	
<i>Peridiniopsis</i> sp.	5	0,0097	
<i>Peridinium</i> cf. <i>umbonatum</i>	5	0,0128	
<i>Peridinium cinctum</i>			2
CRYPTOPHYTA			
<i>Chroomonas</i> sp.	16	0,0058	
<i>Cryptomonas erosa</i>	98	0,2048	
<i>Cryptomonas marssonii</i>	36	0,0240	
<i>Plagioselmis nannoplanctica</i>	1210	0,1059	
CHLOROPHYTA			
<i>Apiocystis</i> sp.			1
<i>Closterium</i> sp.			+
<i>Cosmarium</i> cf. <i>botrytis</i>			1
<i>Cosmarium reniforme</i>			1
<i>Cosmarium</i> sp.			1
<i>Elakatothrix gelatinosa</i>	10	0,0006	
<i>Monomastix</i> sp.	31	0,0009	
<i>Mougeotia</i> sp.			1
<i>Oedogonium</i> sp.			1
<i>Paulschulzia tenera</i>	248	0,0445	3
<i>Spirogyra</i> sp.			1
Clorococales no coloniales			
<i>Closteriopsis longissima</i>	5	0,0121	
<i>Monoraphidium minutum</i>	36	0,0009	
Clorococales coloniales			
<i>Botryococcus braunii</i>			1
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	248	0,0302	2
<i>Oocystis</i> cf. <i>submarina</i>	78	0,0024	2
<i>Pediastrum boryanum</i>			+
<i>Pediastrum tetras</i>	21	0,0056	+
<i>Scenedesmus disciformis</i>	62	0,0036	

Volvocales coloniales			
<i>Eudorina elegans</i>			1
<i>Pandorina morum</i>			1

TOTAL	15810 células/mL	0,58 mm ³ /L
Porcentaje de cianobacterias	16,80%	
Concentración clorofila (mg Clo-a/m³)	2,02	
InGA	0,60	

Clases de abundancia	% de presencia
+	presencia
1	<1%
2	1-10%
3	11-30%
4	31-60%
5	>60%



Fitoplancton

Fecha muestreo		16/07/2009	
COMPOSICIÓN	ABUNDANCIA células/mL	BIOVOLUMEN mm ³ /L	CUALITATIVO
CYANOPHYTA			
<i>Coelosphaerium kuetzingianum</i> (col/mL)	4	0,0327	2
BACILLARIOPHYCEAE			
Diatomeas no coloniales			
<i>Nitzschia acicularis</i>	4	0,0026	
CHRYSOPHYCEAE (sensu lato)			
Crisofíceas no coloniales			
<i>Kephyrion rubi-claustri</i>	164	0,0055	
<i>Pseudopedinella erkensis</i>	17	0,0019	
HAPTOPHYTA			
<i>Chrysochromulina parva</i>	69	0,0024	
EUGLENOIDEA			
<i>Trachelomonas volvocinopsis</i>	4	0,0107	
XANTOPHYCEAE			
<i>Nephrodiella lunaris</i>	99	0,0089	
DINOPHYTA			
<i>Ceratium hirundinella</i>	9	0,4237	3
<i>Gymnodinium cnecoides</i>	4	0,0016	
CRYPTOPHYTA			
<i>Cryptomonas erosa</i>	4	0,0083	
<i>Cryptomonas marssonii</i>	4	0,0027	
<i>Katablepharis ovalis</i>	17	0,0012	
<i>Rhodomonas minuta</i>	1229	0,1075	
CHLOROPHYTA			
<i>Chlorohormidium</i> sp.	112	0,0163	
<i>Cosmarium abbreviatum</i>	9	0,0105	
<i>Cosmarium botrytis</i>	4	0,1542	
<i>Elakathrix gelatinosa</i>	52	0,0029	
<i>Mougeotia</i> sp.	4	0,0095	
<i>Planctonema lauterbornii</i>	65	0,0037	
Clorococales no coloniales			
<i>Ankyra ocellata</i>	34	0,0100	
<i>Monoraphidium skujae</i>	4	0,0001	
<i>Tetraedron minimum</i>	56	0,0522	
Clorococales coloniales			
<i>Crucigenia quadrata</i>	17	0,0005	
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	86	0,0105	
<i>Oocystis marssonii</i>	43	0,0166	
<i>Oocystis solitaria</i>	9	0,0112	
<i>Oocystis</i> sp.	9	0,0003	
<i>Pediastrum boryanum</i>			2
<i>Scenedesmus acutus</i>	17	0,0020	
<i>Scenedesmus disciformis</i>			1
<i>Scenedesmus ecornis</i>	9	0,0004	
<i>Scenedesmus insignis</i>	34	0,0049	
<i>Tetrachlorella alternans</i>	26	0,0058	

Volvocales coloniales			
<i>Eudorina illionensis</i>	595	0,3000	5

TOTAL	2813 células/mL	1,22 mm ³ /L
Porcentaje de cianobacterias	0,00%	
Concentración clorofila (mg Clo-a/m³)	2,44	
InGA	0,90	

Clases de abundancia	% de presencia
+	presencia
1	<1%
2	1-10%
3	11-30%
4	31-60%
5	>60%



Fitoplancton

Fecha muestreo	10/08/2010
----------------	------------

COMPOSICIÓN	ABUNDANCIA células/mL	BIOVOLUMEN mm ³ /L	CUALITATIVO
CYANOPHYTA			
<i>Aphanocapsa delicatissima</i> (col/mL)	8	0,5236	
<i>Aphanocapsa elachista</i> (col/mL)	15	0,9817	2
<i>Coelosphaerium kuetzingianum</i> (col/mL)	23	0,1882	1
<i>Planktolyngbya limnetica</i> (fil/mL)	15	0,0027	
<i>Raphidiopsis mediterranea</i> (fil/mL)	100	0,0113	+
BACILLARIOPHYCEAE			
Diatomeas no coloniales			
<i>Amphora</i> sp.	8	<0,0001	1
<i>Craticula</i> sp.			+
<i>Denticula</i> sp.			1
<i>Epithemia</i> sp.			1
<i>Fragilaria ulna</i>	8	0,0111	2
<i>Gomphonema</i> sp.			1
<i>Navicula</i> sp.	8	0,0151	
<i>Stephanodiscus hantzschii</i>	8	0,0126	
Diatomeas coloniales			
<i>Fragilaria</i> cf. <i>crotonensis</i>	31	0,0725	
CHRYSOPHYCEAE (sensu lato)			
Crisofíceas no coloniales			
<i>Mallomonas</i> sp.	8	0,0015	
<i>Ochromonas</i> sp.	31	0,0056	
<i>Pseudopedinella</i> sp.	31	0,0035	
Crisofíceas coloniales			
<i>Dinobryon divergens</i>	409	0,1018	4
HAPTOPHYTA			
<i>Chrysochromulina parva</i>	1226	0,0345	
EUGLENOPHYTA			
<i>Euglena acus</i>			2
<i>Lepocinclis texta</i>			+
<i>Phacus tortus</i>			1
<i>Trachelomonas hispida</i>			1
<i>Trachelomonas volvocina</i>	31	0,0529	1
<i>Trachelomonas volvocinopsis</i>			1
XANTOPHYCEAE			
Mischococcal indet.	1681	0,3019	
<i>Nephrodiella acuta</i>	131	0,0039	
DINOPHYTA			
<i>Gymnodinium</i> cf. <i>aeruginosum</i>	15	0,0298	1
<i>Gymnodinium cneoides</i>	8	0,0036	
<i>Peridinium</i> cf. <i>cinctum</i>	31	1,0442	4
<i>Peridinium umbonatum</i>	39	0,1353	2
CRYPTOPHYTA			
<i>Cryptomonas erosa</i>	15	0,0061	
<i>Cryptomonas phaseolus</i>	69	0,0340	
<i>Rhodomonas minuta</i>	46	0,0046	

CHLOROPHYTA			
<i>Cosmarium abbreviatum</i>	301	0,4723	3
<i>Cosmarium impressulum</i>	8	0,0223	
<i>Mougeotia</i> sp.			+
<i>Oedogonium</i> sp.			+
<i>Pseudosphaerocystis lacustris</i>	46	0,0088	1
<i>Spirogyra</i> sp.			+
<i>Staurastrum lunatum</i>			1
<i>Staurastrum messikommeri</i>			+
Clorococales no coloniales			
<i>Chlorella</i> sp.	46	0,0030	
<i>Monoraphidium contortum</i>	15	0,0005	1
<i>Tetraedron minimum</i>	100	0,0844	
<i>Tetraedron triangulare</i>	8	0,0055	
Clorococales coloniales			
<i>Botryococcus braunii</i>			2
<i>Coelastrum astroideum</i>	62	0,0070	
<i>Coenochloris hindakii</i>			1
<i>Dictyosphaerium ehrenbergianum</i>			2
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	463	0,0500	3
<i>Kirchneriella irregularis</i>	123	0,0017	
<i>Oocystis parva</i>	108	0,0117	
<i>Oocystis</i> sp.	39	0,0092	
<i>Pediastrum boryanum</i>			2
<i>Quadrigula closterioides</i>	31	0,0048	
<i>Scenedesmus brevispina</i>			+
<i>Scenedesmus ecornis</i>	93	0,0051	
<i>Scenedesmus obtusus</i>	8	0,0007	1
Volvocales coloniales			
<i>Eudorina elegans</i>	147	0,0419	3
<i>Pandorina morum</i>	31	0,0167	3

TOTAL	5624 células/mL	4,33 mm ³ /L
Porcentaje de cianobacterias	0,32%	
Concentración clorofila (mg Clo-a/m³)	14,09	
InGA	0,55	

Clases de abundancia	% de presencia
+	presencia
1	<1%
2	1-10%
3	11-30%
4	31-60%
5	>60%

**Vegetación acuática**

Fecha muestreo	01/08/2007	26/08/2008	16/07/2009	10/08/2010
COMPOSICIÓN				
CLOROPHYTA				
Characeae				
<i>Chara vulgaris</i>			+	
MAGNOLIOPHYTA				
MAGNOLIOPSIDA				
Ceratophyllaceae				
<i>Ceratophyllum demersum</i>	+	+	+	
<i>Ceratophyllum submersum</i>	+	+	+	+
Ranunculaceae				
<i>Ranunculus cf. aquatilis</i>		+	+	
Polygonaceae				
<i>Polygonum amphium</i>	+	+	+	+
Elatinaceae				
<i>cf. Elatine</i>	+			
Haloragaceae				
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>			+	
<i>Myriophyllum cf. spicatum</i>				+
<i>Myriophyllum sp.</i>	+	+	+	
Lamiaceae				
<i>Lycopus europaeus</i>				+
<i>Stachys sp.</i>				+
LILIOPSIDA				
Potamogetonaceae				
<i>Potamogeton pectinatus</i>		+	+	
Zannichelliaceae				
<i>Zannichellia palustris</i>		+	+	
Cyperaceae				
<i>Bolboschoenus maritimus</i>				+
<i>Carex sp.</i>	+	+	+	+
<i>Eleocharis palustris</i>				+
<i>Scirpoides holoschoenus</i>				+
<i>Scirpus lacustris</i>				+
<i>Scirpus sp.</i>	+	+	+	
Typhaceae				
<i>Typha sp.</i>				+

Riqueza específica (nº de taxones de macrófitos)	6	9	11	11
% cinturón de helófitos	25%	70%	70%	70%



Fauna bentónica de invertebrados

Macroinvertebrados

Fecha muestreo	01/08/2007	26/08/2008	16/07/2009	10/08/2010
COMPOSICIÓN	Abundancia relativa (%)	Abundancia relativa (%)	Abundancia relativa (%)	Abundancia relativa (%)
Ph. MOLUSCA				
Cl. Pulmonata				
O. Basommatophora				
F. Planorbidae	1,76		1,28	
F. Ancyliidae				
<i>Ancylus sp.</i>		3,47		
Ph. ANELIDA				
Cl. Hirudinea				
O. Arthyncobdellidae				
F. Glossiphonidae	0,32	0,58	0,32	
<i>Helobdella stagnalis</i>		3,12		
Cl. Oligochaeta			3,19	
O. Tubificida				
F. Naididae	33,99		+	
Ph. ARTHROPODA				
Cl. Aracnida				
F. Acari				
<i>Hydracarina sp.</i>	0,48			
SuperCl. CRUSTACEA				
Supercl. INSECTA				
Cl. Euentomata				
O. Odonata				
F. Coenagrionidae	1,76		1,92	
<i>Coenagrion sp.</i>		0,35		
<i>Ischnura sp.</i>		0,35		
F. Aeshnidae	0,08		0,32	
F. Cordulidae	0,04			
O. Ephemeroptera				
F. Caenidae	2,73		16,60	
<i>Caenis sp.</i>		12,95		
F. Baetidae	30,14		11,81	
<i>Baetis sp.</i>		44,39		
O. Hemiptera				
F. Corixidae	1,28	21,27	54,91	
<i>Cymatia sp.</i>			0,08	
<i>Micronecta sp.</i>	4,97			
F. Pleidae		0,12		
<i>Plea sp.</i>	3,21			
F. Naucoridae		0,12		
<i>Naucoris sp.</i>			0,32	
F. Notonectidae				
<i>Notonecta sp.</i>	0,16			
F. Aphelocheiridae				
<i>Aphelocheirus sp.</i>	0,32			
O. Coleoptera				
F. Hygrobiidae				
<i>Hygrobia sp.</i>	0,16			
F. Dytiscidae				

Muestra mal
conservada
(sin macro_
invertebrados)

Fecha muestreo	01/08/2007	26/08/2008	16/07/2009	10/08/2010
----------------	------------	------------	------------	------------

COMPOSICIÓN	Abundancia relativa (%)	Abundancia relativa (%)	Abundancia relativa (%)	Abundancia relativa (%)
<i>Hygrotus sp.</i>			0,32	
O. Diptera				
F. Culicidae		13,18		
F. Chironomidae	17,80		8,30	
O. Tricoptera				
F. Leptoceridae	0,80		0,32	
F. Hydroptilidae		0,12	0,32	
Total (%)	100	100	100	-

Nº IND./MUESTRA	2.495	865	2.506	-
Nº TAXONES	17	12	13	-
RIC	17	15	14	-

Fauna bentónica de invertebrados

Microinvertebrados

Fecha muestreo	01/08/2007	26/08/2008	16/07/2009	10/08/2010
----------------	------------	------------	------------	------------

COMPOSICIÓN	Abundancia relativa (%)	Abundancia relativa (%)	Abundancia relativa (%)	Abundancia relativa (%)
Ph. ARTHROPODA				
SubPh. Crustacea				
Cl. Branchiopoda				
<i>Ceriodaphnia pulchella</i>	26,3			57,37
<i>Ceriodaphnia dubia</i>		6,75	8,48	
<i>Chydorus sphaericus</i>			3,99	1,78
<i>Daphnia longispina</i>		51,53		2,59
<i>Daphnia rosea</i>			11,97	
<i>Simocephalus vetulus</i>	0,6			0,65
<i>Scapholeberis rammneri</i>	15,3			
<i>Alona rectangula</i>	2,3			
<i>Bosmina longirostris</i>				1,46
<i>Pleuroxus aduncus</i>				0,65
<i>Alonella excisa</i>				0,16
<i>Alonella exigua</i>			2,99	
Cl. Copepoda				
<i>Acanthocyclops robustus</i>				1,13
<i>Tropocyclops prasinus</i>	45,8	38,04	67,33	34,20
Cl. Ostracoda		3,68		
<i>Ilyocypris sp</i>			5,24	
Ph. ROTIFERA				
Cl. Rotatoria				
<i>Brachionus quadridentatus</i>	8,8			
<i>Cephalodella sp.</i>	1,1			
Total (%)	100	100	100	100

Índice ACCO	2,42	7,61	6,69	4,90
-------------	------	------	------	------



MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL EBRO

LAGUNA DE GUALGUERRERO

Red de lagos

PUNTO DE MUESTREO



Vista del lago y de los campos de cultivo circundantes en 2008



Vista del lago en 2009

VEGETACIÓN



Sirpus sp



Polygonum amphibium, *Ceratophyllum* sp y
Myriophyllum sp



Ceratophyllum sp y *Myriophyllum* sp





Scirpus sp.

ADICIONAL INFORME LAGUNA DE GUALGUERRERO 2007-2010

Durante el año 2022 se han revisado los datos de la Laguna de Gualguerrero recopilados durante los años 2017 a 2010, en aplicación del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, a partir de la trasposición de la Directiva Marco del Agua (DMA).

La metodología utilizada ha consistido en obtener del informe de dicho año los datos necesarios para estimar de nuevo el estado trófico y el estado ecológico y, recalcular el valor correspondiente en cada variable y en el estado final del lago, utilizando las métricas publicadas en 2015, lo que permite comparar el estado de los lagos en un ciclo interanual de forma homogénea.

En cada apartado considerado se indica la referencia del apartado del informe original al que se refiere este trabajo adicional.

1. EVALUACIÓN DEL ESTADO

El **estado** de una masa de agua es el grado de alteración que presenta respecto a sus condiciones naturales, y viene determinado por el *peor valor* de su estado ecológico y químico.

- El estado ecológico es una expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales en relación con las condiciones de referencia (es decir, en ausencia de alteraciones). Se determina a partir de indicadores de calidad (biológicos y fisicoquímicos).
- El estado químico de las aguas es una expresión de la calidad de las aguas superficiales que refleja el grado de cumplimiento de las normas de calidad ambiental de las sustancias prioritarias y otros contaminantes.

El estado de las masas de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado ecológico y estado químico.

El estado ecológico de las aguas superficiales se clasificará como muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo. Para clasificar el estado ecológico de las masas de agua

superficial se aplicarán los indicadores de los elementos de calidad, los valores del anexo II del Real Decreto 817/2015 y las NCA calculadas para los contaminantes específicos o en su caso, las NCA del anexo V para las sustancias preferentes.

El estado químico de las aguas superficiales se clasificará como bueno o no alcanza el buen estado. Para clasificar el estado químico se aplicarán las NCA de las sustancias incluidas en el Anexo IV del Real Decreto 817/2015 (sustancias prioritarias y otros contaminantes).

La clasificación del estado de las masas llevará asociado un nivel de confianza que se calculará conforme a los criterios especificados en el Anexo III B del citado Real Decreto.

La clasificación del estado ecológico se realizará con los resultados obtenidos para los indicadores correspondientes a los elementos de calidad biológicos, químicos y fisicoquímicos, e hidromorfológicos y vendrá determinado por el elemento de calidad cuyo resultado final sea el más desfavorable.

La clasificación del estado químico de una masa de agua se evalúa mediante el análisis de conformidad de la concentración de las sustancias prioritarias y otros contaminantes con las NCA recogidas en el Anexo IV. Corresponde a la clasificación peor de cada una de las sustancias del anexo IV.

2. ELEMENTOS DE CALIDAD BIOLÓGICOS (EC-BIO)

2.1 Composición, abundancia y biomasa de Fitoplancton (EC-BIO)

Datos obtenidos de una muestra integrada (MFIT) (dos veces al año): en marzo-mayo (lagos temporales); en mayo-agosto (lagos permanentes someros) y en julio-sept (lagos permanentes profundos).

Se aplica el protocolo MFIT-2013 Versión 2, utilizando dos métricas:

- Concentración de clorofila a (CONCLOA_ZF). Fórmula tricromática de Jeffrey y Humphrey (1975). Media de los valores de las métricas durante los dos análisis.

- Biovolumen total de fitoplancton (BVOL_T_FTP). Sumatorio de biovolúmenes de los taxones de fitoplancton para cada análisis y el dato final será la media de los valores de biovolumen total obtenidos en los análisis de los dos muestreos anuales.

Para la evaluación del estado ecológico de las masas de agua de la categoría lago mediante el elemento de calidad fitoplancton, se deberá seguir el procedimiento descrito a continuación.

Las métricas de fitoplancton aplicables a lagos son únicamente aquellas que tienen en cuenta aspectos de abundancia y biomasa, es decir, la concentración de clorofila *a* y el biovolumen total de fitoplancton. Son dependientes del tipo de lago, y se consideran según la tabla A1.

Tabla A1. Métricas aplicables a los tipos de lagos para la evaluación del estado ecológico.

Tipos	Clorofila a	Biovolumen fitoplancton
1	Si	Si
2	Si	Si
3	Si	Si
4	Si	Si
5	Si	No aplicable
10	Si	Si
11	Si	Si
15	Si	Si
16	Si	No aplicable
18	Si	No aplicable
20	Si	No aplicable
21	Si	No aplicable
22	Si	No aplicable
23	Si	No aplicable
24	Si	No aplicable
26	Si	No aplicable

El fitoplancton es un indicador de respuesta trófica y, por lo tanto, integra todas las variables causales, de modo que está influido por otros condicionantes ambientales además de estarlo por los niveles de nutrientes. Se utilizan dos parámetros como estimadores de la biomasa algal en los índices: concentración de clorofila *a* en la zona fótica ($\mu\text{g/L}$) y biovolumen total de fitoplancton (mm^3/L).

Al contar en este estudio mayoritariamente con sólo una campaña de muestreo, y por tanto no contar con una serie temporal que nos permitiera la detección del máximo anual, se utilizan las clases de calidad relativas a la media anual (tabla A2). La utilización de los límites de calidad relativos a la media anual de clorofila se basó en el hecho de que los muestreos fueron realizados durante la estación de verano. Según la bibliografía limnológica general, el verano coincidiría con un descenso de la producción primaria motivado por el agotamiento de nutrientes tras el pico de producción típico de finales de primavera. Por ello, la utilización de los límites o rangos relativos al máximo anual resultaría inadecuada.

Concentración de clorofila *a*

Del conjunto de pigmentos fotosintetizadores de las microalgas de agua dulce, la clorofila *a* se emplea como un indicador básico de biomasa fitoplanctónica. Todos los grupos de microalgas contienen clorofila *a* como pigmento principal, pudiendo llegar a representar entre el 1 y el 2 % del peso seco total. La clasificación del estado ecológico de acuerdo con la concentración de clorofila *a* se indica en la tabla A2.

Tabla A2. Límites de cambio de clase del estado ecológico y condición de referencia según tipo de lago y el RCE calculado de la concentración de clorofila *a*.

Límite de cambio de clase estado ecológico	Condición de referencia (mg/m ³)	Muy Bueno / Bueno	Bueno / Moderado	Moderado / Deficiente	Deficiente / Malo
Tipo 1	1,0	0,67	0,45	0,30	0,15
Tipo 2	0,9	0,64	0,42	0,29	0,15
Tipo 3	1,3	0,68	0,49	0,34	0,17
Tipo 4	1,5	0,65	0,43	0,26	0,13
Tipo 5	1,8	0,62	0,37	0,24	0,13
Tipo 10	2,5	0,71	0,46	0,32	0,18
Tipo 11	1,6	0,67	0,40	0,28	0,13
Tipo 15	2,7	0,71	0,46	0,32	0,19
Tipo 16	3,8	0,68	0,42	0,23	0,15
Tipo 18	3,5	0,66	0,42	0,25	0,15
Tipo 20	3,5	0,61	0,37	0,25	0,13
Tipo 21	3,2	0,59	0,32	0,21	0,10
Tipo 22	3,0	0,58	0,38	0,26	0,13
Tipo 23	4,7	0,62	0,43	0,25	0,12
Tipo 24	4,9	0,63	0,46	0,26	0,12
Tipo 26	5,5	0,66	0,47	0,27	0,14

Biovolumen algal

El biovolumen es una medida mucho más precisa de la biomasa algal, por tener en cuenta el tamaño o volumen celular de cada especie, además del número de células. La clasificación del estado ecológico de acuerdo al biovolumen de fitoplancton se indica en la tabla A3.

Tabla A3. Límites de cambio de clase del estado ecológico y condición de referencia según tipo de lago y el RCE del biovolumen algal del fitoplancton.

Límite de cambio de clase estado ecológico	Condición de referencia (mm ³ /L)	Muy Bueno / Bueno	Bueno / Moderado	Moderado / Deficiente	Deficiente / Malo
Tipo 1	0,7	0,64	0,38	0,24	0,12
Tipo 2	0,6	0,67	0,44	0,31	0,15
Tipo 3	1,4	0,67	0,55	0,37	0,18
Tipo 4	1	0,71	0,49	0,34	0,17
Tipo 10	0,7	0,58	0,34	0,26	0,13
Tipo 11	0,2	0,67	0,34	0,19	0,10
Tipo 15	1,5	0,65	0,48	0,32	0,19

- Cálculo de Ratio de Calidad Ecológico (RCE)

Se debe seguir el procedimiento descrito en el Protocolo MFIT-2013 Versión 2 para el cálculo del RCE de cada uno de los cuatro parámetros:

Cálculo para clorofila a:

$$RCE = [(1/Chla \text{ Observado}) / (1/Chla \text{ Condición de referencia})]$$

Cálculo para biovolumen:

$$RCE = [(1/biovolumen \text{ Observado}) / (1/ biovolumen \text{ Condición de referencia})]$$

Se utilizarán los valores de las Condiciones de Referencia (CR) de las métricas, para cada tipo de masa de agua, recogidos en la legislación.

- Transformación de RCE a escalas numéricas equivalentes

Los valores de RCE obtenidos se deben transformar a escalas numéricas equivalentes para normalizarlos a una escala lineal común.

Los Ratios de Calidad Ecológica transformados se obtendrán mediante la aplicación de la siguiente fórmula, que no es más que una interpolación lineal entre los límites de

cambio de clase de los Ratios de Calidad Ecológica que se han establecido para cada indicador, y los que se corresponden con una escala lineal.

$$RCE_trans = Val.trans_i + (RCE-Val_i) \times (Val.trans_s - Val.trans_i) / (Val_s - Val_i)$$

Donde:

- RCE_trans = Ratio de Calidad Ecológica transformado
- RCE = Ratio de Calidad Ecológica sin transformar
- Val.trans_i = Valor de RCE de cambio de clase estado ecológico inferior transformado
- Val_i = Valor de RCE de cambio de clase de estado ecológico inferior sin transformar
- Val.trans_s = Valor de RCE de cambio de clase de estado ecológico superior transformado
- Val_s = Valor de RCE de cambio de clase de estado ecológico superior sin transformar

Se utilizarán para cada tipo de masa de agua los valores del RCE de las métricas recogidos en la legislación, con los que se comparará el RCE sin transformar de la muestra (Val_i). Los valores de RCE de cambio de clase de estado ecológico superior sin transformar (Val_s) –que constituyen el límite superior de una clase de estado ecológico– se calcularán como el valor inmediatamente inferior con 2 decimales de los valores del RCE de cambio de clase de estado ecológico inferior sin transformar, recogidos en la legislación.

Para el cálculo, se utilizarán los Val.trans_s y Val.trans_i que figuran en la tabla siguiente:

Clase de estado	Valores de RCE de cambio de clase de estado ecológico superior transformado (Val.trans _s)	Valores de RCE de cambio de clase de estado ecológico inferior transformado (Val.trans _i)
Muy bueno	1,00	0,80
Bueno	0,79	0,60
Moderado	0,59	0,40
Deficiente	0,39	0,20
Malo	0,19	0,00

- Combinación de RCE transformados para la clasificación del estado ecológico

La combinación de los RCE transformados de los indicadores para la clasificación del estado ecológico del elemento de calidad composición, abundancia y biomasa de fitoplancton se realizará utilizando la siguiente fórmula:

$RCE\ trans\ final\ (MFIT) = 0,75\ RCE_trans\ (CONCLOa) + 0,25\ RCE_trans\ (BVOLTOT)$

El valor final de la combinación de los RCE transformados (RCE trans final) se utilizará para la clasificación del estado ecológico, de acuerdo a la escala de clases de estado ecológico indicada en el apartado anterior.

2.2. Composición y abundancia de Otra Flora Acuática (macrófitos) (EC-BIO)

El cálculo se realiza a partir de una muestra anual realizada en un momento favorable para la vegetación.

Se sigue el protocolo OFALAM-2013. Se elige el peor valor del índice que posee varias métricas (OFALAM). No se aplica en lagos de los tipos 1 a 4 situados a más de 2300m de altitud.

- Presiones de tipo HM: Se hace la media. (OFALAM_P_HM)
 - Presencia/Ausencia de hidrófitos (PRESENCIA_HID): tipos 1-8, y entre éstos, sólo en aquéllos que de manera natural puedan tenerlos. Se excluyen lagos situados a altitud mayor a 2300m, que discrimina a algunos de los lagos de los tipos de alta montaña (tipos 1-4).
 - Riqueza de especies de macrófitos típicos (RIQ_SPS_MAF): tipos 10-12, 14-19 y 24-29.
 - Cobertura total de hidrófitos típicos (COBER_T_HID): tipos 10-12, 14-16, 18 y 20-29.
 - Cobertura total de helófitos típicos (COBER_T_HEL): tipos 10-12, 14-16, 18 y 20-29.
 - Cobertura total de macrófitos típicos (hidrófitos+helófitos) (COBER_T_MAF_L): se aplica sólo a los tipos de lagos con hidropериodo temporal (tipos 17 y 19). No hay en la CHE de esas tipologías.
- Presión por eutrofización: Se coge el valor de cobertura de especies de macrófitos indicadoras de condiciones eutróficas (COBER_SPS_EUT): todos los tipos de lagos naturales excepto en los tipos 9, 13 y 30 (que no se encuentran en la Demarcación del Ebro).
- Presión por introducción de especies exóticas: Se coge el valor de cobertura de especies exóticas de macrófitos (COBER_SPS_EXO): todos los tipos de lagos naturales excepto en los tipos 9, 13 y 30 (que no se dan en la CHE).

2.3. Composición y abundancia de Fauna bentónica de Invertebrados (EC-BIO).

Se toma una muestra anual. Se sigue el protocolo ML-L-I-2013 e IBCAEL 2013. Se coge el valor del índice (IBCAEL). La fórmula de cálculo es la siguiente:

$$IBCAEL = (ABCO + 1) \times \log(RIC + 1)$$

El índice ABCO (ABUN_BCO) se obtiene a partir de una muestra de microinvertebrados bentónicos.

El índice RIC (RIC) se obtiene a partir de una muestra de macroinvertebrados bentónicos.

3. ELEMENTOS DE CALIDAD FISICOQUÍMICOS (EC-FQ)

Se debe tomar cuatro muestras anuales de la zona fótica, calculándose hasta 2019 como la media de los valores anuales. A partir de 2020 se calcula con la mediana de los valores anuales como establece la Guía de Estado. Si solo se ha realizado un muestreo, se tomará ese único valor.

Se elige el peor valor entre los siguientes indicadores de calidad (MIN_FQ) según los rangos señalados en RD 817/2015:

ELEMENTOS DE CALIDAD FQ (EC-FQ)	INDICADORES DE CALIDAD FQ (IC-FQ)
Transparencia	Disco de Secchi (tipos 1-7, 9-12 y 14-15) (SECCHI)
Estado de acidificación	pH (PH_ZF) (todos los tipos)
Condiciones relativas a nutrientes	P total (P_TOT) (tipos 1-12, 14-24 y 26-30)

3.1. Transparencia

La transparencia es un elemento válido para evaluar el estado ecológico del lago; tiene alta relación con la productividad biológica; y además tiene rangos establecidos fiables y de utilidad para el establecimiento de los límites de clase del estado ecológico. Se ha evaluado a través de la profundidad de visión del disco de Secchi (DS), considerando su valor para la obtención de las distintas clases (tabla A4).

Tabla A4. Límites de cambio de clase de estado ecológico según la profundidad de visión del Disco de Secchi estimada en metros.

Clase de estado ecológico	Muy Bueno/Bueno	Bueno/Moderado
Tipo 1	6,0	4,5
Tipo 2	6,0	4,0
Tipo 3	4,5	3,0
Tipo 4, 10, 15	4,0	3,0
Tipo 5, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26	No considerado	

3.2. pH

El pH es un elemento válido para evaluar el estado ecológico del lago; tiene alta relación con la productividad biológica; y además tiene rangos establecidos fiables y de utilidad para el establecimiento de los límites de cambio de clase de estado ecológico. Se ha utilizado la medida de pH, considerando su valor para la obtención de las distintas clases (tabla A5).

Tabla A5. Límites de cambio de clase de estado ecológico según el valor de pH.

Clase de estado ecológico	Bueno/Moderado	Moderado/Deficiente
Tipo 1, 3	6,0 - 9,0	≤ 6 o ≥ 9
Tipo 2, 4, 15, 18, 24, 26	7,0 - 9,5	≤ 7 o $\geq 9,5$
Tipo 5	6,0 - 9,5	≤ 6 o $\geq 9,5$
Tipo 10, 11	7,0 - 9,7	≤ 7 o $\geq 9,7$
Tipo 16	6,5 - 9,5	$\leq 6,5$ o $\geq 9,5$
Tipo 20, 21, 22, 23	7,5 - 10,5	$\leq 7,5$ o $\geq 10,5$

3.3. Concentración de nutrientes

En este caso se ha seleccionado el fósforo total (P_TOT), ya que su presencia a determinadas concentraciones en un lago o masa de agua supone procesos de eutrofización, pues en la mayoría de los casos es el principal elemento limitante para el crecimiento de las algas.

Se ha empleado el resultado obtenido en la muestra integrada, considerando los criterios de la OCDE especificados en la tabla A6 (OCDE, 1982) adaptado a los intervalos de calidad del RD 817/2015.

Tabla A6. Límites de cambio de clase de estado ecológico según la concentración de fósforo total estimado en µg/L.

Clase de estado ecológico	Muy Bueno/Bueno	Bueno/Moderado
Tipo 1, 2	8,0	12,0
Tipo 3, 4	12,0	18,0
Tipo 5	18,0	26,0
Tipo 10	16,0	28,0
Tipo 11	12,0	22,0
Tipo 15	16,0	28,0
Tipo 16*	20,0	45,0
Tipo 18*	22,0	50,0
Tipo 20, 21, 22, 23*	40,0	100,0
Tipo 24, 26*	30,0	80,0

* En lagunas someras de los tipos 16 al 30, en caso que la abundancia de la avifauna justifique los valores elevados de P_TOT, esta variable no se considerará en el cálculo.

Si se toman varios datos anuales, se hace la *mediana* de los valores anuales.

3.4. Sustancias preferentes y contaminantes específicos de cuenca

Dentro de los indicadores fisicoquímicos también se tienen en cuenta las **sustancias preferentes y contaminantes específicos de cuenca**. El valor medio de los datos anuales se revisa para ver si *cumple o no con la Norma de Calidad Ambiental (NCA) del Anexo V del RD 817/2015*. Si *incumple* supone asignarle para los indicadores fisicoquímicos la categoría de *moderado* (tabla A7).

Tabla A7. Límite de cambio de clase de estado ecológico para sustancias preferentes y contaminantes específicos de cuenca.

Clase de estado ecológico	Muy Bueno	Moderado
Sustancias preferentes y contaminantes específicos de cuenca	Cumple NCA	No cumple NCA

4. ELEMENTOS DE CALIDAD HIDROMORFOLOGICO (EC-HM)

Se realiza una toma de muestras anual, y del resultado obtenido se elige el peor valor.

- Alteración del hidroperiodo y del régimen de fluctuación del nivel del agua (ALT_HID_NIV)
- Alteración del régimen de estratificación (ALT_REG_EST)
- Alteración del estado y estructura de la cubeta (ALT_EST_CUB)
- Alteración del estado y estructura de la zona ribereña (ALT_EST_RIB)

5. CALCULO DEL ESTADO FINAL (EF)

Para el cálculo del estado ecológico (EE) se consideran el estado Biológico, el estado Físicoquímico y el estado Hidromorfológico, de la siguiente manera:

EC-BIO (EE_BIO)	EC-FQ (EE_FQ)	EC-HM (EE_HM)	EEco (EE)
MuyBueno (1-MB)	MB (1-MB)	MB (1-MB)	MB (1-MB)
	BU (2-BU)	MB/BU	BU (2-BU)
	MO (3-MO)		MO (3-MO)
Bueno (2-BU)	MB/BU	MB/BU	BU (2-BU)
	MO		MO (3-MO)
Moderado (3-MO)	Indistinto	Indistinto	MO (3-MO)
Deficiente (4-DE)			DE (4-DE)
Malo (5-MA)			MA (5-MA)

El estado químico (EQ) es “*no bueno*” cuando hay algún incumplimiento de la Norma de Calidad Ambiental, bien sea como media anual (NCA_MA), como máximo admisible (NCA_CMA) o en la biota (NCA_biota) para las **sustancias prioritarias y otros contaminantes** (tabla A8). Las NCA se recogen en el *Anexo IV del RD 817/2015*.

Tabla A8. Clases de estado químico para sustancias prioritarias y otros contaminantes.

Clase de estado químico	Bueno	No alcanza el buen estado
Sustancias prioritarias y otros contaminantes	Cumple NCA	No cumple NCA
Valoración de cada clase	2	3

Al comparar los resultados para cada métrica con los umbrales establecidos en el RD 817/2015, se ha tenido en cuenta que en el caso de que el resultado coincida exactamente con el LCC (límite de cambio de clase):

- Para EC-BIO y EC-FQ gales, se considerará en la clase inferior con NFC alto.
- Para EC-HMF, se considerará en la clase superior con NFC bajo.
- Para EC-FQ contaminantes específicos, se considerará que cumple la NCA pero con NFC bajo.

El estado (EF) de la masa de agua es el *peor valor* entre su estado ecológico y su estado químico según el diseño de la tabla A9.

Tabla A9. Determinación del estado final.

Estado Final (EF)	Estado Químico (EQ)	
Estado Ecológico (EE)	Bueno	No alcanza el buen estado
Bueno o superior	Bueno	Inferior a bueno
Moderado	Inferior a bueno	
Deficiente		
Malo		

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO LAGUNA DE GUALGUERRERO (MAS 7673).

AÑO 2007

Se han considerado los indicadores especificados en los apartados anteriores para los valores medidos en el lago, estableciéndose el estado ecológico global del lago según la metodología descrita con los límites de clase indicados para la tipología nº 16.

En la tabla A10 se incluye el estado ecológico indicado por cada uno de los parámetros, así como la catalogación de la masa de agua teniendo en cuenta los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos según la valoración de este estado ecológico final para cada campaña de muestreo.

Tabla A10. Diagnóstico del estado ecológico según los indicadores.

INDICADOR	VALOR	ESTADO ECOLOGICO
INDICADORES DE CALIDAD HIDROMORFOLÓGICOS		Muy Bueno
INDICADORES DE CALIDAD FISICOQUÍMICOS		
DISCO SECCHI (m)	1,1	NC*
pH	9,10	Bueno
CONCENTRACIÓN P TOTAL (mg/L)	0,052	Moderado
INDICADORES DE CALIDAD BIOLÓGICOS		
CLOROFILA a (µg/L)	14,83	Moderado
BIOVOLUMEN ALGAL (mm ³ /L)		NC*
FITOPLANCTON (EE_MFIT)		Moderado
COBERTURA DE ESPECIES INDICADORAS DE EUTROFIA (NºEspecies)	Sin dato	
COBERTURA DE ESPECIES EXÓTICAS (NºEspecies)	Sin dato	
HIDRÓFITOS (Presencia/ Ausencia)		NC*
COBERTURA HELÓFITOS (%)	25	Deficiente
COBERTURA HIDROFITOS (%)	Sin dato	
RIQUEZA DE MACRÓFITOS (Nº especies)	6	Moderado
OTRA FLORA ACUÁTICA (EE_OFALAM)		Deficiente
ÍNDICE IBCAEL	4,30	Malo
INVERTEBRADOS (EE_IBCAEL)		Malo

NC: No Considerado en esta tipología de lago para el cálculo del Estado Ecológico.

Atendiendo a estos valores, el Estado Ecológico sería el siguiente:

Tabla A11. Diagnóstico del estado ecológico.

INDICADOR	Código de estado	Nivel de estado
HIDROMORFOLÓGICO	EE_HM	Muy Bueno
FISICOQUÍMICO	EE_FQ	Moderado
BIOLÓGICO	EE_BIO	Malo
ESTADO ECOLÓGICO	EE	Malo

No se han realizado otros muestreos químicos en este año.

A la vista de los resultados obtenidos, el Estado Final de la Laguna de Gualguerrero es **INFERIOR A BUENO.**

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO LAGUNA DE GUALGUERRERO (MAS 7673).

AÑO 2008

Se han considerado los indicadores especificados en los apartados anteriores para los valores medidos en el lago, estableciéndose el estado ecológico global del lago según la metodología descrita con los límites de clase indicados para la tipología nº 16.

En la tabla A12 se incluye el estado ecológico indicado por cada uno de los parámetros, así como la catalogación de la masa de agua teniendo en cuenta los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos según la valoración de este estado ecológico final para cada campaña de muestreo.

Tabla A12. Diagnóstico del estado ecológico según los indicadores.

INDICADOR	VALOR	ESTADO ECOLÓGICO
INDICADORES DE CALIDAD HIDROMORFOLÓGICOS		Bueno
INDICADORES DE CALIDAD FISICOQUÍMICOS		
DISCO SECCHI (m)	1,0	NC*
pH	8,60	Bueno
CONCENTRACIÓN P TOTAL (mg/L)	0,018	Muy Bueno

INDICADORES DE CALIDAD BIOLÓGICOS		
CLOROFILA a (µg/L)	2,02	Muy Bueno
BIOVOLUMEN ALGAL (mm ³ /L)		NC*
FITOPLANCTON (EE_MFIT)		Muy Bueno
COBERTURA DE ESPECIES INDICADORAS DE EUTROFIA (NºEspecies)	Sin dato	
COBERTURA DE ESPECIES EXÓTICAS (NºEspecies)	Sin dato	
HIDRÓFITOS (Presencia/ Ausencia)		NC*
COBERTURA HELÓFITOS (%)	70	Moderado
COBERTURA HIDROFITOS (%)	Sin dato	
RIQUEZA DE MACRÓFITOS (Nº especies)	9	Bueno
OTRA FLORA ACUÁTICA (EE_OFALAM)		Moderado
ÍNDICE IBCAEL	10,37	Bueno
INVERTEBRADOS (EE_IBCAEL)		Bueno

NC: No Considerado en esta tipología de lago para el cálculo del Estado Ecológico.

Atendiendo a estos valores, el Estado Ecológico sería el siguiente:

Tabla A13. Diagnóstico del estado ecológico.

INDICADOR	Código de estado	Nivel de estado
HIDROMORFOLÓGICO	EE_HM	Bueno
FISICOQUÍMICO	EE_FQ	Muy Bueno
BIOLÓGICO	EE_BIO	Moderado
ESTADO ECOLÓGICO	EE	Moderado

No se han realizado otros muestreos químicos en este año.

A la vista de los resultados obtenidos, el Estado Final de la Laguna de Guialguerrero es **INFERIOR A BUENO.**

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO LAGUNA DE GUALGUERRERO (MAS 7673).

AÑO 2009

Se han considerado los indicadores especificados en los apartados anteriores para los valores medidos en el lago, estableciéndose el estado ecológico global del lago según la metodología descrita con los límites de clase indicados para la tipología nº 16.

En la tabla A14 se incluye el estado ecológico indicado por cada uno de los parámetros, así como la catalogación de la masa de agua teniendo en cuenta los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos según la valoración de este estado ecológico final para cada campaña de muestreo.

Tabla A14. Diagnóstico del estado ecológico según los indicadores.

INDICADOR	VALOR	ESTADO ECOLOGICO
INDICADORES DE CALIDAD HIDROMORFOLÓGICOS		Muy Bueno
INDICADORES DE CALIDAD FISICOQUÍMICOS		
DISCO SECCHI (m)	1,4	NC*
pH	8,20	Bueno
CONCENTRACIÓN P TOTAL (mg/L)	0,023	Bueno
INDICADORES DE CALIDAD BIOLÓGICOS		
CLOROFILA a (µg/L)	2,44	Muy Bueno
BIOVOLUMEN ALGAL (mm ³ /L)		NC*
FITOPLANCTON (EE_MFIT)		Muy Bueno
COBERTURA DE ESPECIES INDICADORAS DE EUTROFIA (NºEspecies)	Sin dato	
COBERTURA DE ESPECIES EXÓTICAS (NºEspecies)	Sin dato	
HIDRÓFITOS (Presencia/ Ausencia)		NC*
COBERTURA HELÓFITOS (%)	70	Moderado
COBERTURA HIDROFITOS (%)	Sin dato	
RIQUEZA DE MACRÓFITOS (Nº especies)	11	Bueno
OTRA FLORA ACUÁTICA (EE_OFALAM)		Moderado
ÍNDICE IBCAEL	9,83	Bueno
INVERTEBRADOS (EE_IBCAEL)		Bueno

NC: No Considerado en esta tipología de lago para el cálculo del Estado Ecológico.

Atendiendo a estos valores, el Estado Ecológico sería el siguiente:

Tabla A15. Diagnóstico del estado ecológico.

INDICADOR	Código de estado	Nivel de estado
HIDROMORFOLÓGICO	EE_HM	Muy Bueno
FISICOQUÍMICO	EE_FQ	Bueno
BIOLÓGICO	EE_BIO	Moderado
ESTADO ECOLÓGICO	EE	Moderado

No se han realizado otros muestreos químicos en este año.

A la vista de los resultados obtenidos, el Estado Final de la Laguna de Gualguerrero es **BUENO**.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO LAGUNA DE GUALGUERRERO (MAS 7673).

AÑO 2010

Se han considerado los indicadores especificados en los apartados anteriores para los valores medidos en el lago, estableciéndose el estado ecológico global del lago según la metodología descrita con los límites de clase indicados para la tipología nº 16.

En la tabla A16 se incluye el estado ecológico indicado por cada uno de los parámetros, así como la catalogación de la masa de agua teniendo en cuenta los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos según la valoración de este estado ecológico final para cada campaña de muestreo.

Tabla A16. Diagnóstico del estado ecológico según los indicadores.

INDICADOR	VALOR	ESTADO ECOLOGICO
INDICADORES DE CALIDAD HIDROMORFOLÓGICOS		Muy Bueno
INDICADORES DE CALIDAD FISCOQUÍMICOS		
DISCO SECCHI (m)	1,2	NC*
pH	8,50	Bueno
CONCENTRACIÓN P TOTAL (mg/L)	0,022	Bueno
INDICADORES DE CALIDAD BIOLÓGICOS		
CLOROFILA a (µg/L)	14,09	Moderado
BIOVOLUMEN ALGAL (mm ³ /L)		NC*
FITOPLANCTON (EE_MFIT)		Moderado
COBERTURA DE ESPECIES INDICADORAS DE EUTROFIA (NºEspecies)	Sin dato	
COBERTURA DE ESPECIES EXÓTICAS (NºEspecies)	Sin dato	
HIDRÓFITOS (Presencia/ Ausencia)		NC*
COBERTURA HELÓFITOS (%)	70	Moderado
COBERTURA HIDROFITOS (%)	Sin dato	
RIQUEZA DE MACRÓFITOS (Nº especies)	11	Bueno
OTRA FLORA ACUÁTICA (EE_OFALAM)		Moderado
ÍNDICE IBCAEL	5,90	Deficiente
INVERTEBRADOS (EE_IBCAEL)		Deficiente

NC: No Considerado en esta tipología de lago para el cálculo del Estado Ecológico.

Atendiendo a estos valores, el Estado Ecológico sería el siguiente:

Tabla A17. Diagnóstico del estado ecológico.

INDICADOR	Código de estado	Nivel de estado
HIDROMORFOLÓGICO	EE_HM	Muy Bueno
FISCOQUÍMICO	EE_FQ	Bueno
BIOLÓGICO	EE_BIO	Deficiente
ESTADO ECOLÓGICO	EE	Deficiente

No se han realizado otros muestreos químicos en este año. A la vista de los resultados obtenidos, el Estado Final de la Laguna de Gualguerrero es **INFERIOR A BUENO**.